

「鹼氣氫氧銅」農藥使用方法及其範圍

中華民國 115 年 3 月 20 日農授防字第 1151875426H 號公告修正

34%(w/w) 鹼氣氫氧銅 水懸劑 (SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
葫蘆科 小葉菜類	露菌病	2.25 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	最多 4 次				
瓜菜類	露菌病	2.25 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	最多 4 次				
胡瓜	露菌病	2.25 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7					
瓜果類	露菌病	2.25 公升	600	病害發生初期開始施藥。	7	最多 4 次				
葡萄	露菌病		600	病害發生初期開始施藥。	7-10	最多 4 次			1. 不可於開花期內施藥。 2. 不可與強鹼物質或含有得恩地或鈣的產品混合使用。	

45%(w/w) 鹼氣氫氧銅 水分散性粒劑 (WG)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
柑桔類	潰瘍病	1-1.25 公斤	1,200	新梢抽出時開始施藥。	10-15	共 3 次				本項新增。原始登記廠商名稱：威群國際有限公司。